


Full d'informació per a famílies sobre **Vacunes no Finançades** a Balears (infants > 2 anys i adolescents)



MENINGITIS



 Calendari de vacunació (dosis)

B

Bexsero®
 (106,15 €/dosi)

2 dosis (separades com a mínim 1 mes)

Trumenba®
 (106,15 €/dosi)

2 dosis (separades com a mínim 6 mesos)

ACWY

Nimenrix®
 (54,64 €/dosi)

1 dosi

Menveo®
 (54,64 €/dosi)

1 dosi

MenQuadfi®
 (54,64 €/dosi)

1 dosi

Virus del papil·loma humà (homes)



 Calendari de vacunació (dosis)

Cervarix®
 (121,81 €/dosi)

- 9-14 anys: **2 dosis** (separades 6 mesos)
- ≥ 15 anys: **3 dosis**

Gardasil 9®
 (177,55 €/dosi)

- 9-14 anys: **2 dosis** (separades com a mínim 6 mesos)
- ≥ 15 anys: **3 dosis**

Vacunes **ANTIMENINGOCÒCCIQUES**

Què és el **meningococ**?

- És un bacteri que causa infeccions greus com la meningitis o la sèpsia.
- Aquestes infeccions poc freqüents són molt greus. Provoquen seqüeles greus en un 10-30% dels casos (com sordesa, retard mental o amputació de membres) i fins i tot poden produir la mort en el 10% dels casos (arribant al 25% en adolescents i adults).

Quines vacunes hi ha disponibles contra el **meningococ**?

Antimeningocòccica B

- Es recomana la vacunació d'infants i adolescents, a partir dels 2 mesos d'edat.
- El nombre de dosis necessàries depèn de l'edat d'inici de la vacunació.

Antimeningocòccica A, C, W, Y

- Es recomana a qualsevol edat (a partir de les 6 setmanes) com a protecció individual.
- El nombre de dosis necessàries depèn de l'edat d'inici de la vacunació.

Tots els infants vacunats abans dels 10 anys hauran de rebre una dosi als 12 anys (finançada dins de calendari).

Bexsero® (106,15 €/dosi)

- A partir dels 2 mesos
- Pauta recomanada:
>2 anys: 2 dosis

Nimenrix® (54,64 €/dosi)

- A partir de les 6 setmanes
- Pauta recomanada:
> 1 any: 1 dosi

Trumenba® (106,15 €/dosi)

- A partir dels 10 anys
- Pauta recomanada: 2 dosis

Menveo® (54,64 €/dosi)

- A partir dels 2 anys
- Es recomana 1 dosi

MenQuadfi® (54,64 €/dosi)

- A partir dels 12 mesos
- Es recomana 1 dosi

Quins són els efectes adversos més comuns?

- Les reaccions més habituals són dolor i envermelliment al lloc d'injecció, especialment als infants més grans.

Vacuna contra el **VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ**

Què és el **Virus del Papil·loma Humà (VPH)**?

- Provoca la infecció de transmissió sexual més freqüent del món.
- Afecta tant a homes com a dones.
- Pot produir lesions benignes com les berrugues genitals o condilomes però també pot produir lesions malignes: neoplàsies anogenitals (com el càncer de cèrvix, el càncer anal o el càncer de penis) i extragenitals (com el càncer de cavitat oral, orofaringe i laringe).

Quines vacunes hi ha disponibles contra el **VPH**?

Cervarix® (121,81 €/dosi)

- A partir dels 9 anys
- Pauta recomanada: 2 dosis
- Si s'administra a partir dels 15 anys: 3 dosis

Vacuna Bivalent
Protegeix contra serotips oncogènics

Gardasil 9® (172,55 €/dosi)

- A partir dels 9 anys
- Pauta recomanada: 2 dosis
- Si s'administra a partir dels 15 anys: 3 dosis

Vacuna Nonavalent
Protegeix contra serotips oncogènics i condilomes

- Les dues vacunes disponibles no són intercanviables.
- El vostre equip de pediatria pot explicar-vos les diferències entre les dues vacunes.

A qui vacunar?

- A la nostra comunitat autònoma està finançada per a dones, malgrat que estan autoritzades i recomanades també per a homes.

Quins són els efectes adversos més comuns?

- Les reaccions adverses més comunes són el dolor i l'envermelliment al lloc d'injecció i la febre.
- En els adolescents no són infreqüents els marejos i lipotímies.