

ROTAVIRUS 				
📅 Calendari de vacunació (dosis)				
Rotateq [®] (69,50 €/dosi)	2 mesos	4 mesos	6 mesos	
Rotarix [®] (93,67 €/dosi)	2 mesos	4 mesos		

MENINGITIS 				
📅 Calendari de vacunació (dosis)				
B Bexsero [®] (106,15 €/dosi)	2-3 mesos	4-5 mesos		12-15 mesos
Resta d'edats consultar amb el vostre equip de pediatria				
ACWY Nimenrix [®] (54,64 €/dosi)	2 mesos	4 mesos		12 mesos
ACWY MenQuadfi [®] (54,64 €/dosi)				12 mesos
Resta d'edats consultar amb el vostre equip de pediatria				

Full d'informació per a famílies sobre **Vacunes no Finançades** a Balears (lactants)



Data d'actualització:
Desembre 2021

Vacunes contra el ROTAVIRUS

Què és el Rotavirus?

- És un virus que causa gastroenteritis (un quadre que es pot presentar amb vòmits, diarrea i febre).
- És la causa més freqüent de diarrea greu a la infància.
- Els quadres més greus es presenten sobre tot als lactants petits i poden necessitar ingrés hospitalari. La complicació més freqüent és la deshidratació.
- Els nounats prematurs són especialment vulnerables a aquest virus, ja que tenen un major risc de contagi i més probabilitats de presentar complicacions.

Quines vacunes hi ha disponibles contra el Rotavirus?

Rotateq® (69,50 €/dosi)

- Pauta recomanada: als 2, 4 i 6 mesos (s'ha de completar abans dels 8 mesos).
- Vacuna pentavalent

Rotarix® (93,67 €/dosi)

- Pauta recomanada: als 2 i 4 mesos (s'ha de completar abans dels 6 mesos).
- Vacuna monovalent

- Les dues vacunes disponibles no són intercanviables.
- El vostre equip de pediatria pot explicar-vos les diferències entre les dues vacunes.

A qui vacunar? Com s'administren les vacunes?

- Recomanada a tots els infants a partir de les 6 setmanes d'edat.
- La seva administració és oral (beguda).

Quins són els efectes adversos més comuns?

- Els efectes adversos més comuns són vòmits, diarrea i febre, tots aquests lleus.
- Un efecte advers molt infreqüent però greu és la invaginació intestinal.

Vacunes ANTIMENINGOCÒCCIQUES

Què és el meningococ?

- És un bacteri que causa infeccions greus com la meningitis o la sèpsia.
- Aquestes infeccions poc freqüents són molt greus. Provoquen seqüeles greus en un 10-30% dels casos (com sordesa, retard mental o amputació de membres) i fins i tot poden produir la mort en el 10% dels casos.

És més freqüent en infants petits, especialment en menors de 12 mesos, i adolescents.

Quines vacunes hi ha disponibles contra el meningococ?

Antimeningocòccica B

- Es recomana la vacunació sistemàtica d'infants i adolescents, a partir dels 2 mesos.
- El nombre de dosis necessàries depèn de l'edat d'inici de la vacunació.

Antimeningocòccica A, C, W, Y

- Es recomana a qualsevol edat (a partir de les 6 setmanes) com a protecció individual.
- El nombre de dosis necessàries depèn de l'edat d'inici de la vacunació.

Tots els infants vacunats abans dels 10 anys hauran de rebre una dosi als 12 anys (finançada dins el calendari).

Bexsero® (106,15 €/dosi)

- A partir dels 2 mesos
- Pauta recomanada:
 - Menors de 2 anys: 2 dosis primàries + 1 record
 - Majors de 2 anys: 2 dosis primàries

Nimenrix® (54,64 €/dosi)

- A partir de les 6 setmanes
- Pauta recomanada:
 - < 1 any: als 2, 4 i 12 mesos o als 4, 6 i 12 mesos
 - > 1 any: 1 dosi

MenQuadfi® (54,64 €/dosi)

- A partir dels 12 mesos
- Es recomana 1 dosi

Quins són els efectes adversos més comuns?

- Les reaccions més habituals són febre i irritabilitat als lactants, i dolor i envermelliment al lloc d'injecció, especialment als infants més grans.