



Hoja de información para familias sobre **Vacunas no Financiadas** en Baleares (niños >2 años y adolescentes)



MENINGITIS 		📅 Calendario de vacunación (dosis)
B	Bexsero ® (106,15 €/dosis)	2 dosis separadas al menos 1 mes
	Trumenba ® (106,15 €/dosis)	2 dosis separadas al menos 6 meses
ACWY	Nimenrix ® (54,64 €/dosis)	1 dosis
	Menveo ® (54,64 €/dosis)	1 dosis
	MenQuadfi ® (54,64 €/dosis)	1 dosis

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (varones) 		📅 Calendario de vacunación (dosis)
	Cervarix ® (121,81 €/dosis)	<ul style="list-style-type: none"> 9-14 años: 2 dosis (separadas 6 meses) ≥ 15 años: 3 dosis
	Gardasil 9 ® (177,55 €/dosis)	<ul style="list-style-type: none"> 9-14 años: 2 dosis (separadas 6 meses) ≥ 15 años: 3 dosis

fecha de actualización:
Diciembre 2021

Vacunas **ANTIMENINGOCÓCICAS**

¿Qué es el **Meningococo**?

- Es una bacteria que causa infecciones graves como la meningitis o la sepsis.
- Estas infecciones poco frecuentes, son muy graves, produciendo secuelas severas en un 10 -30 % de los casos (como sordera, retraso mental o amputación de miembros) e incluso puede producir la muerte en el 10% de los casos (llegando al 25% en adolescentes y adultos).

¿Qué vacunas hay disponibles frente al **Meningococo**?

Antimeningocócica B

- Se recomienda la vacunación de niños y adolescentes, a partir de los 2 meses de edad.
- El número de dosis necesario depende de la edad de inicio de la vacunación.

Bexsero® (106,15 €/ dosis)

- A partir de los 2 meses.
- Pauta recomendada:
> 2 años: 2 dosis.

Trumenba® (106,15 €/ dosis)

- A partir de los 10 años.
- Pauta recomendada: 2 dosis.

¿Cuáles son las reacciones adversas a la vacunación?

- Las reacciones más habituales son dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, especialmente en los niños más mayores.

Antimeningocócica A, C, W, Y

- Se recomienda a todas las edades como protección individual a partir de las 6 semanas de vida.
- El número de dosis necesario depende de la edad de inicio de la vacunación.

Todos los niños vacunados antes de los 10 años, deberán recibir una dosis a los 12 años (financiada dentro de calendario).

Nimenrix® (54,64 €/dosis)

- A partir de las 6 semanas.
- Pauta recomendada:
> 1 año: 1 dosis

Menveo® (54,64 €/dosis)

- A partir de los 2 años.
- Se recomienda 1 dosis.

MenQuadfi® (54,64 €/dosis)

- A partir de los 12 meses.
- Se recomienda 1 dosis.

Vacunas frente al **VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO**

¿Qué es el **Virus del Papiloma Humano (VPH)**?

- Provoca la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo.
- Afecta tanto a hombres como a mujeres.
- Puede producir lesiones benignas como las verrugas genitales o condilomas pero también puede producir lesiones malignas: neoplasias anogenitales (como el cáncer de cérvix, el cáncer anal o el cáncer de pene) y extragenitales (como cáncer en la cavidad oral, orofaringe y laringe).

¿Qué vacunas hay frente al **VPH**?

Cervarix® (121,81 €/dosis)

- A partir de los 9 años.
- Pauta recomendada: 2 dosis.
- Si se administra a partir de los 15 años: 3 dosis

Vacuna Bivalente

Protege frente a serotipos oncogénicos

Gardasil 9® (172,55 €/dosis)

- A partir de los 9 años.
- Pauta recomendada: 2 dosis.
- Si se administra a partir de los 15 años: 3 dosis

Vacuna Nonavalente

Protege frente a serotipos oncogénicos y condilomas

- Las dos vacunas disponibles no son intercambiables.
- Su Equipo de Pediatría puede explicarle las diferencias entre ambas vacunas.

¿A quién vacunar?

- En nuestra CCAA está financiada para mujeres, a pesar de que están autorizadas y recomendadas también en varones.

¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes?

- Las reacciones adversas más comunes son el dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección y la fiebre.
- En adolescentes no son infrecuentes los mareos y lipotimias.