

Hoja de información para familias sobre **Vacunas no Financiadas** en Baleares (lactantes)

ROTAVIRUS 		📅 Calendario de vacunación (dosis)		
Rotateq ® (69,50 €/dosis)	2 meses	4 meses	6 meses	
Rotarix ® (93,67 €/dosis)	2 meses	4 meses		

MENINGITIS 		📅 Calendario de vacunación (dosis)		
B Bexsero ® (106,15 €/dosis)	2-3 meses	4-5 meses		12-15 meses
Resto de edades consultar con su equipo de pediatría				
ACWY Nimenrix ® (54,64 €/dosis)	2 meses	4 meses		12 meses
ACWY MenQuadfi ® (54,64 €/dosis)				12 meses
Resto de edades consultar con su equipo de pediatría				



fecha de actualización:
Diciembre 2021

Vacunas frente al ROTAVIRUS

¿Qué es el Rotavirus?

- Es un virus que causa gastroenteritis (un cuadro que se puede presentar con vómitos, diarrea y fiebre).
- Es la causa más frecuente de diarrea grave en la infancia.
- Los cuadros más graves se presentan sobre todo en los lactantes pequeños y pueden precisar ingreso hospitalario, siendo la complicación más frecuente la deshidratación.
- Los recién nacidos prematuros son especialmente vulnerables a este virus dado que tienen mayor riesgo de contagio y más probabilidades de presentar complicaciones.

¿Qué vacunas hay disponibles frente al Rotavirus?

Rotateq® (69,50 €/dosis)

- Pauta recomendada: a los 2, 4 y 6 meses (ha de completarse antes de los 8 meses).
- Vacuna pentavalente.

Rotarix® (93,67 €/dosis)

- Pauta recomendada: a los 2 y a los 4 meses (ha de completarse antes de los 6 meses).
- Vacuna monovalente.

- Las dos vacunas disponibles no son intercambiables.
- Su Equipo de Pediatría puede explicarle las diferencias entre ambas vacunas.

¿A quién vacunar? ¿Cómo se administran las vacunas?

- Recomendada en todos los niños a partir de las 6 semanas de edad.
- Su administración es oral (bebida).

¿Cuáles son los efectos adversos más comunes?

- Los efectos adversos más comunes son vómitos, diarrea y fiebre, todos ellos leves.
- Un efecto adverso muy infrecuente pero grave es la invaginación intestinal

Vacunas ANTIMENINGOCÓCICAS

¿Qué es el Meningococo?

- Es una bacteria que causa infecciones graves como la meningitis o la sepsis.
 - Estas infecciones poco frecuentes, son muy graves, produciendo secuelas severas en un 10 -30 % de los casos (como sordera, retraso mental o amputación de miembros) e incluso puede producir la muerte en el 10% de los casos.
- Es más frecuente en niños pequeños, especialmente en menores de 12 meses, y adolescentes.

¿Qué vacunas hay disponibles frente al Meningococo?

Antimeningocócica B

- Se recomienda la vacunación sistemática a niños y adolescentes, a partir de los 2 meses.
- El número de dosis necesario depende de la edad de inicio de la vacunación.

Antimeningocócica A, C, W, Y

- Se recomienda a cualquier edad (a partir de las 6 semanas) como protección individual.
- El número de dosis necesario depende de la edad de inicio de la vacunación.

Todos los niños vacunados antes de los 10 años, deberán recibir una dosis a los 12 años (financiada dentro de calendario).

Bexsero® (106,15 €/ dosis)

- A partir de los 2 meses.
- Pauta recomendada:
 - Menores de 2 años: 2 dosis primarias + 1 recuerdo.
 - Mayores de 2 años: 2 dosis primarias.

Nimenrix® (54,64 €/dosis)

- A partir de las 6 semanas.
- Pauta recomendada:
 - < 1 año: a los 2, 4 y 12 meses o a los 4, 6 y 12 meses o a los 6 y 12 meses.
 - > 1 año: 1 dosis.

MenQuadfi® (54,64 €/dosis)

- A partir de los 12 meses.
- Se recomienda 1 dosis.

¿Cuáles son los efectos adversos más comunes?

- Las reacciones más habituales son fiebre e irritabilidad de los lactantes, y dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, especialmente en los niños más mayores.